

## POUČENÍ A SOUHLAS PACIENTA HRUDNÍ PUNKCE

Vážená paní, vážený pane,

k zákroku, který Vám doporučujeme - k hrudní punkci - je třeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění Vašeho rozhodnutí Vás chceme informovat o přípravě, způsobu provedení, významu a možných komplikacích plánovaného zákroku.

### Důvod zákroku:

Důvodem punkce je podezření na závažné onemocnění pohrudnice nebo jiného orgánu, které se na pohrudnici šíří. Smyslem zákroku je odstranit vzniklou tekutinu v pohrudniční dutině a ulevit Vašemu dýchání. Odebraná tekutina se odesílá do laboratoře k vyšetření.

### Příprava k zákroku:

Před výkonem informujte lékaře, **zda netrpíte alergií na dezinfekční, znečítlivující přípravky nebo na léky, zvýšenou krvácivostí, astmatem, cukrovkou nebo jiným onemocněním.** Laboratorní vyšetření, rtg hrudníku a EKG, které je třeba mít před výkonem, Vám zajistí lékař, který výkon indikoval. **Před zákrokem se můžete lehce najíst, ranní léky můžete zapít vodou, pokud Váš lékař neurčí jinak.** K zákroku se dostavte bez přívěšků, náušnic a náhrdelníků.

### Vlastní postup při zákroku:

Zárok se provádí většinou vsedě nebo vleže. Tenká jehla proniká kůží mezi žebry do místa, kde je nahromaděna tekutina. Uložení a pohyb jehly může být kontrolován rtg přístrojem (skiaskop), ultrazvukovým přístrojem (sonograf) nebo výpočetní tomografií (CT). Místo vpichu tenké jehly je možno znečítlivět injekcí nebo zmražením. Odebíraná tekutina se nasává přes jehlu hadičkou do sběrné nádoby. Po dobu odběru udržujte doporučenou polohu a dýchejte dle pokynů lékaře. Po zákroku Vám bude proveden kontrolní rtg snímek hrudníku.

### Možné komplikace:

Výjimečně se může objevit bolest nebo drobné krvácení v místě vpichu. Po výkonu může zcela výjimečně dojít ke kolapsu plíce. Pak je třeba jehlou odsát vzduch z pohrudniční dutiny nebo na několik dní zavést drén do pohrudniční dutiny, aby se plíce mohla zase roztáhnout.

### Chování po výkonu:

**Po výkonu udržujte aspoň 12 hodin klidový režim na nemocničním lůžku,** pokud lékař neurčí jinak. Případné potíže hlase sestře nebo lékaři.

