

## POUČENÍ A SOUHLAS PACIENTA BRONCHOSKOPIE V MÍSTNÍM ZNECITLIVĚNÍ

Vážená paní, vážený pane,

k zákroku, který Vám doporučujeme - k bronchoskopii - je potřeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění Vašeho rozhodnutí Vás chceme informovat o přípravě, způsobu provedení, významu i možných komplikacích plánovaného zákroku.

### Důvod zákroku:

Důvodem bronchoskopie je podezření na závažné onemocnění průdušek, plic nebo pohrudnice, případně léčba těchto nemocí.

### Příprava k zákroku:

Před výkonem informujte lékaře, **zda netrpíte zvýšenou krvácivostí, alergií na léky, cukrovkou, astmatem nebo jiným onemocněním**. Laboratorní vyšetření, rtg hrudníku a EKG, které je třeba mít před výkonem, zajistí lékař, který výkon indikoval. **Před výkonem nesmíte 4 hodiny jíst, pít ani kouřit. Ranní léky můžete zapít vodou, pokud Váš lékař neurčí jinak.** Doporučujeme doprovod na vyšetření. K výkonu se dostavte bez přívěšků, náušnic a náhrdelníků. Pokud máte snímatelnou zubní protézu, vyjměte si ji před výkonem. Bude Vám aplikována injekce pro snížení tvorby slin a léky proti kašli. Lékař Vám provede znečitlivění dutiny ústní sprayem nebo roztokem. Při větším sklonu k dráždivosti je možno těsně před výkonem podat nitrožilní injekci ke snížení úzkosti a vnímání nepříjemných pocitů.

### Vlastní postup při zákroku:

Bronchoskopie je zákrok, který umožňuje optickým přístrojem prohlédnout Vaše dolní dýchací cesty. Provádí se ohebným přístrojem tvaru hadičky - bronchoskopem, je nebolestivé, může působit dráždění ke kašli. Ve zvláštních případech se používá neohebná dutá trubice. Přístroj se zavádí ústy, nebo nosem. Při vyšetření je možno odebrat vzorky tkání a hlenu, které budou vyšetřeny v laboratořích. Je možno ošetřit průdušky, které jsou zúžené, ucpané nebo krvácejí. Během výkonu Vám bude kontrolována srdeční činnost a okysličování krve.



### Možné komplikace:

Při a po výkonu může dojít k zhoršení dechu nebo drobnému krvácení. Po výkonu může několik hodin přetrvávat bolest v krku nebo chrapot. Může se Vám přechodně zvýšit teplota.

### Chování po zákroku:

Pro zhoršené polykání způsobené znečitlivěním je třeba **2 hodiny po výkonu nejíst a nepít**. Pokud jste dostal/a uklidňující injekci, je zakázáno 24 hodin řídit motorové vozidlo. Vyskytne-li se jakákoliv jiná komplikace, informujte svého lékaře.

