

POUČENÍ A SOUHLAS PACIENTA

OPERACE PLIC, MEDIASTINA A HRUDNÍ STĚNY

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vašeho zdravotního stavu a výsledku provedených odborných vyšetření jste byl/a doporučen/a k provedení operace v oblasti pohrudniční dutiny - respektive hrudní stěny.

Tato forma poučení je rámcová a zahrnuje všeobecné principy pro operační výkony v oblasti specializované hrudní chirurgie. Patří sem operace plic, procesů v mezihrudí (kromě operací srdce a cév vystupujících ze srdce) a dále operace hrudní stěny.

Příprava k výkonu

Na Chirurgické klinice tento typ operací provádí vždy tým lékařů specializovaný na problematiku hrudní chirurgie. Operace jsou vždy prováděné v celkové anestézii. U většiny operací je vhodné předoperační zavedení katétru do páteřního kanálu, který pak slouží k pooperačnímu tlumení bolesti. Tento výkon provádí zkušený anesteziolog.

Před operací je nezbytná několikadenní dechová příprava s nácvikem stereotypů dýchání a odkašlávání, které zmenší riziko možných pooperačních plicních komplikací a usnadní pooperační průběh. Nácvik dechové přípravy je většinou zahájen v době hospitalizace na příslušném plicním oddělení a je řízen rehabilitačním pracovníkem. V této činnosti budete individuálně pokračovat až do operace. **Od půlnoci v den výkonu nesmíte jíst, pít ani kouřit.**

Možné komplikace

Možným zánětlivým a embolizačním komplikacím je předcházeno profylaktickým podáváním antibiotik a léků ovlivňujících krevní srážlivost. Komplikace charakteru pooperačního krvácení jsou vzácné. Vlastní postup, možné zvláštnosti nebo eventuální komplikující stavy Vaší operace Vám vysvětlí operátor pověřený provedením operačního zákroku.

Chování po výkonu

Po operaci s ohledem na rozsah výkonu můžete být hospitalizován/a na pooperační jednotce intenzivní péče (JIP), pravidelně se pak vrátíte na specializované oddělení hrudní chirurgie. Převážná většina operací v pohrudniční dutině a operací hrudní stěny musí být v pooperačním průběhu zajištěna drenáží příslušné pohrudniční dutiny. Drenáž bývá napojena na aktivní odsávací systém zhruba 4 - 7 dní a omezí Váš pohyb pouze do okolí lůžka.

Po operaci je pečováno o dýchací cesty zvlhčováním vdechovaného vzduchu, podáváním léků usnadňujících odkašlávání a tlumením bolesti. Večer po operaci můžete pít malé množství tekutiny. Od následujícího dne není většinou omezen příjem jídla a tekutin. Již krátce po operaci je nutná Vaše vlastní aktivita v pohybu na lůžku, dechové rehabilitaci a intenzivním odkašlávání. Jen tak lze zabránit časným pooperačním plicním komplikacím.

