

Onkologie v obrazech

Generalizovaný Kaposiho sarkom

Stručný popis případu: Muž, narozený 1942, přijat dne 17. 7. 2012 do Masarykova onkologického ústavu pro rychlou progresi generalizovaného Kaposiho sarkomu. **Z anamnestických údajů:** Bez výskytu malignit v rodině, pacient nekuřák, příležitostné požití alkoholu, profesí je řábník, více než 40 let v jednom svazku manželském, popírá rizikové chování. Léčí se pro hyperurikemii, chronickou žilní insuficienci, artritidu, ischemickou chorobu srdeční, dlouhodobě warfarinovaný pro fibrilaci síní.

Dle výpisu z dokumentace byl pacient přibližně 1 rok sledován a ošetřován na sektorové chirurgii pro postupně se šířící morfy na kůži, zprvu jedné, později všech končetin. Biopsie zpočátku neprovedena. Během 3 měsíců výraznější progresse s další akce-

rací v posledních 2 týdnech. V červnu 2012 provedena excize z léze v oblasti pravého předloktí, histologicky potvrzen Kaposiho sarkom. Po přijetí pacient kompletně došetřen. Mimo kožní generalizaci onemocnění doprovázenou lymfédémem, s maximem postižení končetin a skrota (obvod skrota 20 cm, kůže zesílena na 2 cm v UZV obraze), bylo zjištěno i postižení sliznice duodena, generalizovaná lymfadenopatie, splenomegalie. Serologické vyšetření vyvrátilo HIV pozitivitu. **Diagnostický závěr:** Kaposiho sarkom, klasická forma, klinické stadium IV (v+), dle práce Brambillové. Dne 27. 7. 2012 byla zahájena protinádorová léčba v režimu Vinblastin/Bleomycin, v současnosti je již patrná regrese nádorových morf ve všech lokalitách a regrese lymfédému končetin a skrota. V plánu pří-



Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: msvoboda@mou.cz

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.*

MUDr. Peter Grell*

MUDr. Radim Němeček*

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. et CSc.†

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.†

*onkolog, †radioterapeut,

‡gastroenterolog

Obdrženo/Submitted: 4. 10. 2012

padná aplikace radioterapie. Další informace, včetně diskuze k léčbě, budou předmětem pozdější kazuistiky.



a) před léčbou



b) před léčbou



c) před léčbou



d) po 6 týdnech od zahájení léčby