

Onkologie v obrazech

Rozměrná regionální metastáza melanomu

Fait V.



Obr. 1. Axilla s protrudující metastázou melanomu před operací.



Obr. 2. Stav po odstranění a sutuře vzniklého defektu.



doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
Oddělení chirurgické onkologie
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
email: inbox@vukfait.com

Obdrženo/Submitted: 1. 6. 2013

Stručný popis případu

61letá pacientka, 3 roky po odstranění melanomu na pravé paži, mimo naše pracoviště, s odstupem dochází k růstu metastázy v axile, která postupně perforuje kůži a dosahuje neobvyklých rozměrů.

Pacientka odkázána k symptomatické terapii, poté přichází na naše pracoviště. Po doplnění CT stav zhodnocen jako potenciálně operabilní. Pacientka operována, relaps se daří kompletně odstranit a dosáhnout zhojení.

U regionálních metastáz melanomu je vhodné vždy na prvním místě zvažovat chirurgické řešení, zhodnocení operability je nutné na pracovišti, které se touto problematikou soustavně zabývá. Záměr těchto operací je primárně paliativní, nicméně v některých případech lze paradoxně dosáhnout i dlouhodobější remise.