

Onkologie v obrazech

Kongenitální naevus – někdy neprávem opomíjené riziko

Fait V.

Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

Kongenitální naevy jsou relativně málo časté melanocytární projevy, typické svým výskytem již při narození, po-



Obr. 1. Kongenitální naevus bez známek malignizace.

měně různorodé morfologie i velikosti, kolísající od drobných znamének až po rozměrné naevy, pokrývající velkou část pokožky. Jsou obvykle považovány především za kosmetický problém, u velkých naevů i s psychickými důsledky, riziko malignizace bývá někdy zbytečně podceňováno. Především u rozměrných naevů je pak mnohdy velmi obtížné případnou změnu včas identifikovat.

Na obrázcích demonstrujeme typický kongenitální naevus (obr. 1), a poté dva fatální případy pozdní diagnostiky melanomu, vyrůstajícího z kongenitálního naevu. V prvním případě (obr. 2) je jasné, že pacient stav výrazně podcenil, zatímco v posledním případě (obr. 3) došlo k malignizaci uvnitř rozsáhlého plavko-



doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Oddělení chirurgické onkologie
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: inbox@vukfait.com

Obdrženo/Submitted: 4. 6. 2015

vého naevu, toto se projevovalo téměř pouze ztlustěním stávajícího části naevu. Při pokusu o chirurgické řešení jsou nalezeny metastatické uzliny v axile i v nadklíčku a po několika týdnech se objevují plicní metastázy.

Doporučujeme skutečně co nejčasnější řešení kongenitálních naevů a v případech, kdy toto není možné, je vždy nutné pravidelné sledování.



Obr. 2. Pokročilý melanom v terénu kongenitálního naevu.



Obr. 3. Pacientka s rozsáhlým plavkovým naevem s relativně obtížně diferencovatelnou malignizací.