

Onkologie v obrazech

Kožní toxicita u cílené léčby dabrafenibem

Kocák I.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno



MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: kocak@mou.cz

Obdrženo/Submitted: 31. 5. 2017

Pacientka ve věku 68 let s diagnózou melanom na krku vlevo. 11/2015 provedena excize prima, histologie Breslow 3,0 mm. 10/2016 zachycen uzlinový relaps na krku vlevo a metastázy do plic. Vyšetřena *BRAF* mutace, zachycena pozitivita. Do systémové léčby zvolen *BRAF* inhibitor – dabrafenib od 10/2016. Do 3 měsíců klinická odpověď – vymizení hmatných ložisek na krku vlevo a na PET/CT i vymizení nálezu na plicích. Častým vedlejším účinkem *BRAF* inhibitorů je indukce sekundárních kožních malignit – spino CA či ložisek cornu cutaneum (obr. 1 a 2). Na obrázku jsou zachyceny morfy typu cornu cutaneum. V případě, že obtěžují, je indikováno jejich odstranění. Po 4 měsících léčby dochází ke spontánnímu odloučení kožních morf. K 5/2016 je pacientka bez známek regionálních metastáz, bez známek viscerální generalizace a bez projevů kožní toxicity, pokračuje v terapii dabrafenibem.



Obr. 1. Indukce sekundárních malignit – spino CA či ložisek cornu cutaneum.



Obr. 2. Indukce sekundárních malignit – spino CA či ložisek cornu cutaneum.