Vyšetření párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (Hevylite™ assay) – přínos pro stratifikaci mnohočetného myelomu?

Assessment of Heavy/Light Chain Pairs of Immunoglobulin (Hevylite™ assay) – Benefit for Stratification of Multiple Myeloma?

Ščudla V.¹, Lochaman P.², Pika T.³, Zapletalová J.⁴, Minařík J.³, Bačovský J.³

¹ III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

² Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc

³ Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

⁴ Ústav lékařské biofyziky, LF UP v Olomouci

Souhrn

Východiska: Cílem bylo srovnání dvou nových stratifikačních modelů mnohočetného myelomu (multiple myeloma – MM), tj. podle Avet-Loisaua (A-L) a podle Ludwiga (L) založených na indexu HLC-r (poměr sérových hladin involved-HLC/uninvolved-HLC tj. HLC- κ /HLC- λ vyšetřených metodou Hevylite™, tj. nefelometrickou/turbidimetrickou technikou s pomocí specifických polyklonálních protilátek na přístroji Binding Site SPA_{PLUS}) a β_2 -mikroglobulinu (β_2 -M) s vybranými prognostickými faktory (PF) MM a stážovacími systémy dle Durieho-Salmona (D-S) a International Staging System (ISS). **Soubor pacientů a metody:** V 132členné sestavě nemocných (94 IgG a 38 IgA typ MM) byl vyšetřen při diagnóze HLC-r, vybrané PF a byla provedena stratifikace souboru podle D-S, ISS, A-L a L. **Výsledky:** Na rozdíl od IgA byl u IgG izotypu zjištěn signifikantní vztah HLC-r k stratifikaci dle D-S a ISS s rozdílností podstadií A vs. B dle D-S ($p = 0,049$) a mezi ISS stadii 1 vs. 3 ($p = 0,001$). V souboru IgG byl vysoce signifikantní souhrnný vztah hloubky poklesu Hb i albuminu a vzestupu β_2 -M k výsledkům stratifikace dle ISS, A-L a L modelu ($p < 0,0001$), vzestupu LDH v systému dle ISS a A-L a kreatininu dle ISS a L, nikoliv ale vztah stadií vyhodnocených podle kteréhokoliv stratifikačního systému k hodnotám FLC-r (poměr volných lehkých řetězců imunoglobulinu κ/λ), trombocytů a Ca. V souboru IgA byl signifikantní souhrnný vztah hloubky poklesu Hb, trombocytů, albuminu a vzestupu β_2 -M k výsledkům stratifikace dle ISS, A-L a L, k vzestupu kreatininu v případě ISS, nikoliv ale hodnot FLC-r, Ca a LDH při použití kteréhokoliv stratifikačního modelu. Stupeň korelace vybraných PF, zejména Hb, albuminu a β_2 -M, případně i trombocytů, LDH a kreatininu ke stadiím dle ISS a k 1.–3. rizikové kategorii podle modelu A-L a L byl u IgG vs. IgA izotypu značně proměnlivě rozdílný ($p < 0,0001$ – $0,030$). Stážovací systém dle ISS se vyznačoval proporcionálním zastoupením stadií 1–3, zatímco v A-L modelu převažovala u IgG i IgA izotypu riziková kategorie 2, tj. intermediate risk (47,3 a 44,7 %) a v modelu dle L riziková kategorie 3, tj. high-risk (41,5 a 52,6 %) s nízkým zastoupením kategorie 1, tj. low-risk (23,4 a 10,5 %). McNemar-Bowkerův test symetrie prokázal v obou izotypech MM nejvyšší shodu mezi stratifikací dle D-S a L v kategorii 3, tj. high-risk (31,9 a 28,9 %) s celkovou shodou pouze v 53,2 a 42,1 % a se signifikantním posunem v případě IgG izotypu ($p = 0,036$). U IgG i IgA izotypu byla souhrnná shoda v zastoupení kategorií 1–3 dle ISS vs. A-L (62,4 a 63,2 %), ale se signifikantním posunem stratifikace ($p = 0,002$ a $0,028$). V případě IgG i IgA izotypu byla úzká shoda mezi modely dle A-L a L (64,5 a 81,6 %) se signifikantně významným vzájemným stratifikačním posunem ($p < 0,0001$ a $0,030$). **Závěr:** Nové stratifikační modely MM dle A-L a L jsou snadno prakticky použitelné, podložené úzkým vztahem k stěžejním PF MM, vyžadují ale separátní hodnocení u IgG a IgA izotypu MM. Výběr optimálního modelu pro potřeby klinické praxe vyžaduje validační studii zaměřenou na přežití do progresu a celkové přežívání.

Klíčová slova

mnohočetný myelom – volné lehké řetězce imunoglobulinu – těžké/lehké řetězce imunoglobulinu – prognóza – stratifikace

Práce byla podpořena IGA MZ ČR, NT/12451-5.

This study was supported by Internal Grant Agency of the Czech Ministry of Health NT/12451-5.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE recommendation for biomedical papers.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6

779 00 Olomouc

e-mail: vlastimil.scudla@fnol.cz

Obdrženo/Submitted: 16. 6. 2015

Přijato/Accepted: 25. 6. 2015

<http://dx.doi.org/10.14735/amko2015359>

Summary

Background: The aim of the study was the comparison of two novel stratification models in multiple myeloma (MM), ie. according to Avet-Loiseau (A-L) and according to Ludwig (L), based on the HLC-r index (ratio of serum levels of involved-HLC/uninvolved-HLC, ie. HLC- κ /HLC- λ assessed using ie. nephelometric/turbidimetric technique using specific polyclonal antibodies on a Binding Site SPA_{PLUS}) technique) and β_2 -microglobulin (β_2 -M) with selected prognostic factors (PF) of MM and staging systems according to Durie-Salmon (D-S) and International Staging System (ISS). **Patients and Methods:** In a cohort of 132 patients (94 with IgG and 38 with IgA type of MM) at the time of diagnosis, we assessed HLC-r, selected PF and D-S, ISS, A-L and L stratification systems. **Results:** Unlike in IgA isotype, in IgG isotype we found a significant relationship of HLC-r to stratification according to D-S and ISS with the difference between A and B substages according to D-S ($p = 0.049$) and between ISS stages 1 vs. 3 ($p = 0.001$). In the IgG group, there was highly significant relationship of the depth of Hb and albumin decrease and β_2 -M increase to the results of stratification according to ISS, A-L and L model ($p < 0.0001$), increase of LDH in the ISS system and A-L, and creatinine according to ISS and L but not the relationship of the stages according to any of the stratification systems to the values of FLC-r (ratio of serum free light chains κ/λ of immunoglobulin), thrombocytes and Ca. In the IgA type, there was a significant relationship of the depth of the decrease of Hb, thrombocytes, albumin and increase of β_2 -M to the results of stratification according to ISS, A-L and L and increase of creatinine in the case of ISS, but not of the values of FLC-r, Ca and LDH in the case of any of the stratification systems. The degree of correlation of selected PF, especially of Hb, albumin and β_2 -M, event. of thrombocytes, LDH and creatinine to the stages according to ISS and to stage 1–3 according to A-L and L model was in IgG vs IgA isotype significantly different ($p < 0.0001$ – 0.030). Staging system according to ISS had proportional distribution of stages 1–3, whereas in the A-L model prevailed in IgA and IgG isotype risk category 2, ie. intermediate-risk (47.3 and 44.7%) and in the L model prevailed risk category 3, ie. high-risk (41.5 and 52.6%) with low count of category 1, ie. low-risk category (23.4 and 10.5%). McNemar-Bowker test of symmetry showed in both types of MM the highest concordance between the stratification according to D-S and L in category 3, ie. high-risk (31.9 vs. 28.9%) with overall accord only in 53.2 and 42.1% and with significant shift in the case of IgG isotype only ($p = 0.036$). In IgG and IgA isotype there was an overall concordance in the distribution of categories 1–3 according to ISS vs. A-L (62.4 and 63.2%) but with significant shift of the stratification ($p = 0.002$ and 0.028). In the case of IgG and IgA isotype there was a close relationship between the models A-L and L (64.5 and 81.6%) with significant stratification shift ($p < 0.0001$ and 0.030). **Conclusion:** The new stratification models for MM according to A-L and L are easily practically applicable, with close relationship to principal PF but they need separate assessment of IgG and IgA isotypes of MM. The choice of optimal model for routine practice needs a validation study aimed at progression free survival and overall survival.

Key words

multiple myeloma – immunoglobulin – free light chain – heavy/light chain – prognosis – stratification

Úvod

Pokroky v diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu (multiple myeloma – MM) přinášejí stále vyšší nároky na precizní stratifikaci, stěžejní východisko individuálně pojaté léčby a odhadu prognózy. Charakteristickým rysem MM je tvorba monoklonálního imunoglobulinu (Mlg) myelomovými/monoklonálními plazmocytami provázená sníženou produkcí normálních/polyklonálních imunoglobulinů (Plg) normálními plazmocytami [1,2]. Vzhledem k závažným limitacím standardních metod analýzy sérových bílkovin u MM v případě nízké hladiny Mlg, IgA izotypu Mlg, při změnách objemu plazmy, hematokritu a v důsledku odlišné intenzity katabolizmu jednotlivých tříd Ig byla vyvinuta technika Hevylite™ umožňující s pomocí specifických protilátek proti junkčním epitopům umístěným mezi těžkým a lehkým řetězcem Ig vyšetření párů těžkých/lehkých řetězců Ig κ a λ (HLC- κ a HLC- λ) [3–9]. Hevylite™ turbidimetrická nebo nefelometrická technika umožňuje současné separátní stanovení sérových hladin Mlg

vytvářeného myelomovými plazmocytami („nádorový“, involved HLC – i-HLC) a Plg („polyklonální/normální“, uninvolved HLC – u-HLC) stejné třídy produkovaného normálními plazmocytami. Vedle současného stanovení i-HLC a u-HLC izotypů IgG- κ , IgG- λ nebo IgA- κ a IgA- λ je v případě MM využíváno rovněž stanovení indexu HLC-r vyjadřujícího vzájemný poměr dominantního i-HLC a alternativního u-HLC [3,4]. Na rozdíl od dosavadních studií využívajících ke stanovení HLC-r vždy poměr HLC- κ /HLC- λ , což vede v případě i-HLC typu λ k získání velmi nízkých a obtížně interpretovatelných hodnot [3,6], byl v naší studii v případě analýzy vztahu vybraných prognostických ukazatelů MM k výsledkům stratifikace myelomu (kategorie 1–3) použit pro výpočet indexu HLC-r v případě izotypu IgG- λ a IgA- λ poměr HLC- λ /HLC- κ , tj. obdobný princip jako pro výpočet indexu monoklonality sFLC κ/λ nebo λ/κ [1,3,4] vedoucí k získání kladných, snadno použitelných hodnot. V posledních čtyřech desetiletích bylo zkoncepováno > 40 stratifikačních sys-

témů rozdělovajících nemocné s MM obvykle do tří stadií nebo rizikových skupin s odlišnou prognózou. Standardní stratifikační systémy dle Durieho-Salmona (D-S) a International Staging System (ISS) používané doposud v klinické praxi nejsou optimální, neboť bezprostředně nevyjadřují biologické vlastnosti myelomových buněk a mikroprostředí kostní dřeně (KD) [2,10], zatímco molekulárně-biologické stratifikační modely založené na cytogenetické analýze a hodnotách cyklinu, tj. systém TC 1–5 [11], a na výsledcích genové expresní analýzy [12] se pro vysokou metodickou náročnost v klinické praxi neprosadily. V roce 2009 Avet-Loiseau (A-L) a v roce 2013 Ludwig (L) zkoncepovali nově pojaté třístupňové stratifikační modely založené na hodnotách β_2 -M (β_2 -mikroglobulin) a indexu HLC-r, vyznačující se v pilotních studiích významným vztahem k přežití bez progresu (progression free survival – PFS) a celkovému přežití (overall survival – OS) [13–15].

Náplní sdělení je posouzení vztahu stratifikačních modelů dle A-L a podle L

Tab. 1. Základní charakteristiky IgG, IgA a celkového souboru nemocných s MM vyšetřeném při rozpoznání nemoci.

	IgG	IgA	IgG + IgA
n	94	38	132
věk	69 (29–89)	65 (49–88)	68 (29–89)
pohlaví (M/Ž)	47/47 (1,0)	16/22 (0,73)	63/69 (0,91)
FLC – celý soubor κ + λ			
• FLC-κ (mg/l)	65,6 (0,4–10 264)	80,5 (0,8–39 721)	71,4 (0,4–39 721)
• FLC-λ (mg/l)	8,8 (0,1–35 038)	7,7 (0,5–16 610)	8,6 (0,1–35 038)
• FLC-r (κ/λ)	9,8 (0,0–5 104)	21,7 (0,0–41 376)	12,8 (0,0–41 376)
HLC – κ + λ			
• HLC-κ (g/l)	18,3 (0,1–97,8)	15,6 (0,02–89,6)	16,9 (0,018–97,8)
• HLC-λ (g/l)	0,746 (0,044–66,6)	0,347 (0,017–65,7)	0,611 (0,017–66,6)
• HLC-r (HLC-κ/HLC-λ)	22,0 (0,002–2 222)	50,3 (0,0003–3 966)	24,6 (0,0003–3 966)
HLC – κ (n)			
• involved-κ (g/l)	64 641,6 (4,4–97,8)	25 2 524,0 (0,0–89,6)	89 26,5 (0,0–97,8)
• uninvolved-λ (g/l)	0,36 (0,04–7,1)	0,07 (0,02–1,34)	0,3 (0,02–7,14)
• HLC-r (HLC-κ/λ)	64,8 (2,7–2 222)	408,9 (3,4–3 966)	97,0 (2,7–3 966)
HLC – λ (n)			
• involved-λ (g/l)	30 28,5 (2,3–66,6)	13 40,4 (0,7–65,7)	43 29,6 (0,7–66,6)
• uninvolved-κ (g/l)	0,63 (0,9–5,5)	0,1 (0,02–0,6)	0,5 (0,02–5,5)
• HLC-r (HLC-κ/λ)	0,02 (0,002–1,4)	0,005 (0,00–0,9)	0,02 (0,00–1,4)
• *HLC-r (HLC-λ/κ)	49,6 (0,7–465,1)	180,0 (0,1–3 110)	57,9 (0,1–3 110)
Hb (g/l)	106 (67–153)	97 (67–153)	103 (67–153)
trombocyty ($\times 10^{12}/l$)	198 (42–427)	196 (67–485)	197 (42–485)
albumin (g/l)	34,7 (14,6–48,6)	37,1 (17,7–47,6)	35,5 (14,6–48,6)
β ₂ -M (mg/l)	4,1 (1,4–39,7)	4,3 (1,6–43,4)	4,1 (1,4–43,4)
Ca (mmol/l)	2,3 (1,7–3,4)	2,4 (1,9–3,5)	2,3 (1,7–3,5)
LDH (μkat/l)	2,9 (1,5–10,8)	2,6 (1,0–4,2)	2,8 (1,0–10,8)
kreatinin (μmol/l)	90 (46–1 666)	90 (30–924)	90 (30–1 666)
Mlg (SPE, g/l)	29,7 (2,9–90,4)	22,8 (2,9–52,6)	25,9 (2,9–90,4)

n – počet nemocných, M – muži, Ž – ženy, FLC – volné lehké řetězce, HLC – pár těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu, HLC-r – poměr involved-HLC-κ/uninvolved-HLC-λ, *HLC-r – poměr involved-HLC-λ/uninvolved-HLC-κ, β₂-M – β₂-mikroglobulin, LDH – laktátdehydrogenáza, Mlg – monoklonální imunoglobulin, SPE – elektroforéza séra

ke klasickým prognostickým faktorům (PF) MM a ke stážovacím systémům dle D-S a ISS [2,10,13–16]. Vzhledem k biologické rozdílnosti IgG a IgA izotypu MM, prokázané mj. i v rámci předchozích Hevylite™ studií, byla použita separátní analýza souborů s IgG a IgA izotypem MM [3,17–21].

Soubor nemocných a metody

Základem prospektivní studie byla 163členná sestava nemocných s MM splňujících diagnostická kritéria International Myeloma Working Group (IMWG); medián věku byl 68 (29–89) let, poměr M/Ž 0,91 [2,10,22]. Pro nepřítomnost intaktní molekuly Mlg (Bence-Jonesův

a nesekreční typ MM) a omezené spektrum specifických Hevylite™ souprav (nikoliv pro IgD a biklonální typ MM) bylo z analýzy vyloučeno 31 (19 %) jedinců. Hevylite™ analýza sér zmražených na –78 °C, deponovaných v biobance Oddělení klinické biochemie a Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc, se zaměřila na 132členný soubor složený z 94 nemocných třídy IgG (71,2 %) a 38 nemocných (28,8 %) třídy IgA (poměr κ/λ 1,9) vyšetřených při diagnóze MM. Koncentrace Mlg byla vyšetřena přístrojem Sebia Hydrasy (souprava Sebia Hydragel 30 Protein) s kvantifikací M-gradientu s pomocí skeneru Epson 1680, IFE byla prováděna soupravou Hydragel 4 IF.

Hladiny volných lehkých řetězců (FLC) v séru byly vyšetřeny soupravami Freelite SPA Plus κ free (normální rozmezí 3,3–19,4 mg/l) a Freelite SPA Plus λ free (5,7–26,3 mg/l) a vyšetření bylo doplněné výpočtem indexu monoklonality FLC-r (0,26–1,65) [3,4]. Koncentrace HLC v séru byla vyšetřena turbidimetrem SPA Plus (the Binding Site) soupravami Hevylite Human s hodnotami normálního rozmezí: IgG-κ 3,84–12,07 g/l, IgG-λ 1,91–6,74 g/l, poměr IgG-κ/IgG-λ 1,12–3,21, IgA-κ 0,57–2,08 g/l, IgA-λ 0,44–2,04 g/l a poměr IgA-κ/IgA-λ 0,78–1,98. Část vzorků vyžadovala vzhledem k vysoké koncentraci HLC převyšující měřicí rozsah přístroje manuální

Tab. 2. Hodnocení vztahu indexu HLC-r ke stádiím MM 1–3 dle Durieho-Salmona (D-S) a podle International Staging System (ISS).

IgG	*HLC-r	IgA	*HLC-r				
	M	p	M-W		M	p	M-W
D-S				D-S			
stadium 1	17,2 (4,7–825)	0,039	0,049	stadium 1	87,9 (32,9–330)	NS	–
stadium 2	27,9 (2,7–1 485)			stadium 2	799 (0,8–3 966)		
stadium 3	85,6 (0,7–2 222)			stadium 3	322 (1,1–3 465)		
podst. A	49,3 (0,7–2 222)			podst. A	408 (0,8–3 966)	NS	–
podst. B	91,8 (19,3–1 485)			podst. B	322 (3,4–2 243)		
ISS				ISS			
stadium 1	24,9 (2,7–825)	0,005	0,001	stadium 1	180 (32,9–2 641)	NS	–
stadium 2	57,3 (0,7–2 222)			stadium 2	95,5 (0,8–3 465)		
stadium 3	106,6 (19,3–884,5)			stadium 3	691 (1,1–3 966)		

HLC-r – poměr párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu κ a λ (HLC- κ/λ), M – medián, D-S – stážovací systém dle Durieho-Salmona, ISS – International Staging System, M-W – test dle Mann-Whitneye, NS – nesignifikanční výsledek

předřazení. Sérové hladiny β_2 -M byly vyšetřeny metodou ELISA ($< 2,3$ mg/l), hodnoty Hb a trombocytů v krvi, Ca, albuminu, kreatininu a LDH v séru byly vyšetřeny standardními postupy. K základní stratifikaci MM byl použit stážovací systém dle D-S a ISS [2,22], ke stratifikaci do rizikových skupin byly použity modely dle A-L a L. Dle A-L se vyznačovala riziková skupina 1 (low-risk) přítomností β_2 -M $< 3,5$ a hodnotou HLC-r v rozmezí 0,01–200, skupina 2 (intermediate-risk) buď hodnotou β_2 -M $\geq 3,5$, nebo HLC-r $< 0,01$ nebo > 200 a skupina 3 (high-risk) současnou přítomností hodnoty β_2 -M $\geq 3,5$ a HLC-r $< 0,01$ nebo > 200 [13,14,16]. Ve stratifikačním modelu MM dle L se vyznačovala riziková skupina 1 (low-risk) přítomností hodnoty β_2 -M $< 3,5$ a HLC-r v rozmezí 0,022–45, riziková skupina 2 (intermediate-risk) hodnotou β_2 -M $\geq 3,5$ nebo HLC-r $< 0,022$ nebo > 45 , zatímco riziková skupina 3 (high-risk) současnou přítomností hodnoty β_2 -M $\geq 3,5$ a HLC-r $< 0,022$ nebo > 45 [15]. Nemocní zařazení do studie podepsali informovaný souhlas, design studie byl schválen etickou komisí FN Olomouc.

Získaná data byla analyzována pomocí statistického software SPSS verze 15

(SPSS Inc., Chicago, USA). K analýze byl použit test dle Kruskala-Wallise, Mann-Whitneyův post hoc test s Bonferroniho korekcí signifikance na mnohonásobné porovnávání a McNemarův-Bowkerův test symetrie. Normalita dat byla posouzena pomocí Shapiro-Wilk testu. Všechny testy byly prováděny na hladině signifikance 0,05.

Výsledky

Základní charakteristiky (mediány a rozmezí analyzovaných hodnot) celého 132členného souboru nemocných s MM a dvou podsouborů IgG a IgA jsou shrnuty v tab. 1. Abnormální hodnoty jednotlivých laboratorních parametrů měly v celkové sestavě MM podstatně rozdílné zastoupení: patologické hodnoty indexu HLC-r 98 % a FLC-r 96,2 % souboru, hodnota Hb < 120 g/l 80,3 % a trombocytů $< 150 \times 10^9$ /l pouze 19,6 %, hodnota Ca $> 2,9$ mmol/l 7,5 %, albuminu < 35 g/l 47,7 %, β_2 -M $> 2,3$ mg/l 81 %, LDH $> 3,6$ μ kat/l 16,6 % a kreatininu séra > 104 μ mol/l 39,3 %. Rozbor vztahu mezi abnormální hodnotou indexu *HLC-r a stupněm pokročilosti MM vyhodnocením s pomocí stážovacího systému dle D-S a ISS v souboru IgG prokázal na rozdíl od souboru IgA zvyšování

hodnot mediánů *HLC-r s pokročilostí nemoci, statistická analýza proto vyzněla u obou izotypů MM zřetelně rozdílně. V IgG souboru byla na rozdíl od souboru IgA zjištěna při souhrnné analýze celé stratifikace metodou dle Kruskala-Wallise statisticky významná rozdílnost hodnot *HLC-r (tab. 2). Hlubší analýza s pomocí U testu dle Mann-Whitneye prokázala signifikantně vyšší hodnoty *HLC-r v podstadiu B vs. A (dle D-S) a při použití stratifikace dle ISS ve stadiu 3 nežli stadiu 1.

Analýza vztahu hodnot vybraných laboratorních PF k rizikovým skupinám MM 1–3 vyhodnocených s pomocí stratifikačního modelu dle A-L, podle L a se standardně zavedeným stážovacím systémem dle ISS prokázala u jednotlivých PF, stratifikačních systémů a izotypů MM rozdílné výsledky (tab. 3). V souboru IgG byla zjištěna při souborné analýze rizikových skupin 1–3 s pomocí testu dle Kruskala-Wallise shodně u všech tří stratifikací (ISS, A-L a L) vysoce signifikantní rozdílnost hodnot Hb, albuminu a β_2 -M ($< 0,0001$), signifikantní rozdílnost hodnot LDH při použití systému dle ISS a A-L a kreatininu v případě ISS a L. Vyhodnocení indexu monoklonality FLC-r, počtu trombocytů a hodnot Ca v séru vyznělo

Tab. 3. Souborná analýza vztahu vybraných prognostických laboratorních ukazatelů mnohočetného myelomu k stadiím (dle Durieho-Salmona – D-S a International Staging System – ISS) a rizikovým skupinám 1–3 vyhodnoceným podle Avet-Loisiaua (A-L) a Ludwiga (L) s pomocí Kruskalova-Wallisova testu v souboru 94 nemocných s IgG typem myelomu.

Riziková skupina	1			2			3			K-W		
stratifikace	ISS (M)	A-L (M)	L (M)	ISS (M)	A-L (M)	L (M)	ISS (M)	A-L (M)	L (M)	ISSP	A-Lp	Lp
FLC-r	6,1	6,1	5,7	26,8	26,8	20,1	19,0	19,0	20,1	NS	NS	NS
Hb (g/l)	116	117	11	107	100	109	89	88	82	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
trombocyty (× 10⁹/l)	200	210	207	211	198	198	171	173	195	NS	NS	NS
albumin (g/l)	41,1	40,1	41,1	34,0	34,4	38,2	31,1	29,5	31,1	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
β₂-M (mg/l)	2,1	2,2	2,2	3,9	4,9	3,5	9,8	8,3	7,2	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Ca (mmol/l)	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,2	2,3	NS	NS	NS
LDH (μkat/l)	2,9	2,9	3,0	3,1	2,6	2,6	3,2	3,2	2,9	0,001	0,033	NS
kreatinin (μmol/l)	72	72	169	91	112	91	114	90	108	< 0,0001	NS	0,0003

K-W – test dle Kruskala-Wallis, ISS – stážovací systém dle International Staging System, A-L – stratifikace do rizikových skupin dle Avet-Loisiaua, L – stratifikace dle Ludwiga, FLC-r – index monoklonality vyjadřující poměr sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu κ/λ, Hb – hemoglobin, β₂-M – β₂-mikroglobulin, LDH – laktátdehydrogenáza, NS – nesignifikantní význam, M – medián

Tab. 4. Analýza rozdílnosti hodnot vybraných laboratorních ukazatelů mezi jednotlivými klinickými stadii (dle Durieho-Salmona – D-S a International Staging System – ISS) a rizikovými skupinami 1–3 vyhodnocenými podle Avet-Loisiaua (A-L) a Ludwiga (L) s pomocí Mann-Whitneyova post hoc U testu signifikance s Bonferroniho korekcí v souboru 94 nemocných s IgG typem MM.

Laboratorní PF	FLC-r	Hb	Thr	Albumin	β ₂ -M	Ca	LDH	Kreatinin
Stadia dle D-S								
1 vs. 2	–	NS	–	NS	NS	–	–	–
1 vs. 3	–	0,021	–	0,012	0,001	–	–	–
2 vs. 3	–	0,022	–	0,015	0,023	–	–	–
Stadia dle ISS								
1 vs. 2	–	0,009	NS	< 0,0001	< 0,0001	–	0,017	0,031
1 vs. 3	–	< 0,0001	NS	< 0,0001	< 0,0001	–	NS	< 0,0001
2 vs. 3	–	0,0003	NS	NS	< 0,0001	–	0,003	0,013
Riziková skupina dle A-L								
1 vs. 2	–	0,0001	–	0,015	< 0,0001	–	NS	< 0,0001
1 vs. 3	–	< 0,0001	–	0,0001	< 0,0001	–	NS	0,034
2 vs. 3	–	0,042	–	NS	NS	–	NS	NS
Riziková skupina dle L								
1 vs. 2	–	0,024	–	NS	0,001	–	–	0,026
1 vs. 3	–	< 0,0001	–	0,0003	< 0,0001	–	–	0,0001
2 vs. 3	–	< 0,0001	–	< 0,0001	< 0,0001	–	–	NS

PF – prognostické faktory, D-S – stážovací systém dle Durieho-Salmona, ISS – stážovací systém dle International Staging System, A-L – stratifikace do rizikových skupin dle Avet-Loisiaua, L – stratifikace do rizikových skupin dle Ludwiga, FLC-r – index monoklonality vyjadřující poměr sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu κ/λ, Hb – hemoglobin, Thr – trombocyty, β₂-M – β₂-mikroglobulin, LDH – laktátdehydrogenáza, NS – nesignifikantní význam

Tab. 5. Souborná analýza vztahu vybraných prognostických laboratorních ukazatelů MM k stádiím (dle Durieho-Salmona – D-S a International Staging System – ISS) a rizikovým skupinám 1–3 vyhodnoceným podle Avet-Lousiaua (A-L) a Ludwiga (L) s pomocí Kruskalova-Wallisova testu v souboru 38 nemocných s IgA typem myelomu.

Riziková skupina	1			2			3			K-W		
stratifikace	ISS (M)	A-L (M)	L (M)	ISS (M)	A-L (M)	L (M)	ISS (M)	A-L (M)	L (M)	ISSP	A-Lp	Lp
FLC-r	4,9	1,4	14,4	26,9	16,4	5,3	102	87,2	84,6	NS	NS	NS
Hb (g/l)	122	117	122	102	100	112	109	87	88	0,001	0,003	0,003
trombocyty ($\times 10^9/l$)	210	204	217	214	224	216	143	141	143	0,022	0,004	0,020
albumin (g/l)	39,9	42,1	40,0	33,5	38,2	38,5	33,8	33,5	32,1	0,004	0,014	0,009
β_2-M (mg/l)	2,2	2,2	2,1	3,9	4,9	2,9	12,6	8,3	6,6	< 0,0001	< 0,0001	0,0003
Ca (mmol/l)	2,4	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	33,5	2,2	2,5	NS	NS	NS
LDH (μkat/l)	2,3	2,9	2,5	2,5	2,6	2,7	3,0	2,5	2,5	NS	NS	NS
kreatinin (μmol/l)	76	81	77	86	81	83	178	141	139	< 0,0001	NS	NS

K-W – test dle Kruskala-Wallis, ISS – stážovací systém dle International Staging System, A-L – stratifikace do rizikových skupin dle Avet-Loisiaua, L – stratifikace dle Ludwiga, FLC-r – index monoklonality vyjadřující poměr sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu κ/λ , Hb – hemoglobin, β_2 -M – β_2 -mikroglobulin, LDH – laktátdehydrogenáza, NS – nesignifikantní význam, M – medián

Tab. 6. Analýza rozdílnosti hodnot vybraných laboratorních ukazatelů mezi jednotlivými klinickými stadii (dle Durieho-Salmona – D-S a International Staging System – ISS) a rizikovými skupinami 1–3 vyhodnocenými podle Avet-Loisiaua (A-L) a Ludwiga (L) s pomocí Mann-Whitneyova post hoc U testu signifikance s Bonferroniho korekcí v souboru 38 nemocných s IgA typem MM.

Laboratorní PF	FLC-r	Hb	Thr	Albumin	β_2 -M	Ca	LDH	Kreatinin
Stadia dle D-S								
1 vs. 2	–	0,011	NS	NS	0,005	NS	–	–
1 vs. 3	–	0,011	NS	0,005	0,003	NS	–	–
2 vs. 3	–	NS	NS	NS	NS	NS	–	–
Stadia dle ISS								
1 vs. 2	–	NS	NS	0,030	0,0004	–	–	NS
1 vs. 3	–	0,010	0,021	0,006	< 0,0001	–	–	< 0,0001
2 vs. 3	–	NS	NS	NS	0,0002	–	–	0,006
Rizikové skupiny dle A-L								
1 vs. 2	–	0,043	NS	NS	0,008	–	–	–
1 vs. 3	–	0,003	0,024	0,024	0,001	–	–	–
2 vs. 3	–	NS	0,012	NS	NS	–	–	–
Rizikové skupiny dle L								
1 vs. 2	–	NS	NS	NS	0,077	–	–	–
1 vs. 3	–	0,010	NS	NS	0,006	–	–	–
2 vs. 3	–	0,049	0,030	0,018	0,010	–	–	–

PF – prognostické faktory, D-S – stážovací systém dle Durieho-Salmona, ISS – stážovací systém dle International Staging System, A-L – stratifikace do rizikových skupin dle Avet-Loisiaua, L – stratifikace do rizikových skupin dle Ludwiga, FLC-r – index monoklonality vyjadřující poměr sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu κ/λ , Hb – hemoglobin, Thr – trombocyty, β_2 -M – β_2 -mikroglobulin, LDH – laktátdehydrogenáza, NS – nesignifikantní význam

Graf 1. Vztah zastoupení stadií/rizikových kategorií 1–3 vyhodnocených s pomocí čtyř stratifikačních systémů (podle Durieho-Salmona – D-S, International Staging System – ISS, Avet-Loisaua – A-L a Ludwiga – L) v souborech s MM typu IgG (n = 94) a IgA (n = 38).

nesignifikantně. Hlubší analýza IgG souboru s použitím U post hoc testu dle Mann-Whitneye prokázala různě výraznou signifikantní rozdílnost hodnot Hb mezi všemi stadii (1, 2 a 3) při použití stratifikačního modelu dle ISS, A-L a L a s výjimkou stadií 2 vs. 3 i v případě β_2 -M. V případě kreatininu byly významně odlišné hodnoty ve všech stadiích dle ISS, nikoliv ale mezi rizikovými skupinami 2 vs. 3 dle A-L a L. V případě albuminu nebyla v případě stratifikace dle ISS a A-L signifikantní rozdílnost mezi kategoriemi 2 vs. 3, v případě modelu dle L mezi 1 vs. 2. Na rozdíl od stratifikace dle A-L a L byl zaznamenán významný rozdíl hladin LDH mezi stadii 2 vs. 1 a vs. 3 v případě stážování dle ISS, nikoliv ale při vyhodnocení počtu krevních destiček (tab. 4). V souboru IgA byla zjištěna při souborné analýze všech tří stadií/rizikových skupin s pomocí testu dle Kruskala-Wallis s použitím stratifikace dle ISS, A-L a L signifikantní rozdílnost hodnot Hb, trombocytů, albuminu a β_2 -M a v případě ISS i kreatininu, zatímco

hodnocení FLC-r, Ca a LDH vyznělo ve všech stratifikacích nevýznamně (tab. 5). Hlubší analýza souboru IgA s použitím U post hoc testu dle Mann-Whitneye prokázala signifikantně nižší hodnoty Hb při použití ISS stratifikace pouze mezi stadii 1 vs. 3, zatímco v případě aplikace modelu dle A-L v rizikových skupinách 2 a 3 vs. 1, v modelu dle L nižší hodnoty Hb v rizikové skupině 3 vs. 1 i 2 (tab. 6). V případě β_2 -M byla rozdílnost hladin s výjimkou rizikových kategorií 2 vs. 3 dle A-L signifikantní mezi všemi kategoriemi dle ISS, A-L a L. V případě počtu krevních destiček a hladiny albuminu byly patrné signifikantně nižší hodnoty v kategoriích 3 vs. 1 dle ISS i A-L a 3 vs. 2 dle L, v případě albuminu navíc i ve stadiu 2 vs. 1 dle ISS a trombocytů ve stadiu 3 vs. 2 dle A-L. V případě kreatininu byla odhalena signifikantně vyšší hodnota ve stadiu 3 vs. 2 a vs. 1 dle ISS. V případě hladin FLC-r, Ca a LDH nebyl zaznamenán v IgA souboru mezi dílčími kategoriemi 1–3 vyčleněnými podle ISS, A-L a L žádný signifikantní vztah. Doplň-

ková analýza věnovaná stážovacímu systému dle D-S prokázala v souboru IgG s pomocí Mann-Whitneyho testu signifikantně vyšší hodnoty Hb, albuminu a β_2 -M ve stadiích 3 vs. 1 a vs. 2 s absencí rozdílnosti FLC-r, trombocytů, Ca, LDH a kreatininu (tab. 4). V souboru IgA byly shledány s pomocí Mann-Whitneyho testu v případě stratifikace dle D-S signifikantně vyšší hodnoty Hb a nižší β_2 -M ve stadiu 1 vs. 2 i 3 a nižší hodnoty albuminu ve stadiu 3 vs. 1, zatímco v případě FLC-r, trombocytů, Ca, LDH a kreatininu nebyly signifikantně významné rozdíly zachyceny (tab. 6).

Rozdílné zastoupení klinických stadií 1–3 vyhodnocených s pomocí stážovacích systémů dle D-S a ISS a rizikových skupin vyčleněných s pomocí modelů dle A-L a podle L v souborech IgG a IgA vyplývá z grafu 1. Výsledky srovnávací analýzy stratifikace IgG a IgA souborů MM provedené s pomocí McNemar-Bowkerova testu symetrie jsou zachyceny v tab. 7. Srovnáním stratifikačního modelu dle A-L se standardním

Tab. 7. Srovnání shodnosti a změny stratifikace MM do kategorií 1–3 s použitím čtyř stratifikačních systémů v souborech IgG a IgA s pomocí McNemar-Bowkerova testu (n = 132).

	IgG						IgA					
stratifikace	Avet-Loisiau [13,14]			Ludwig [15]			Avet-Loisiau [13,14]			Ludwig [15]		
riziková skupina	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Stadium dle D-S (%)												
1	7,5			6,4			7,9			5,3		
2		16,1			14,9			7,9			7,9	
3			14,0			31,9			18,4			28,9
celková shoda	35/93 (37,6 %)			50/94 (53,2 %)			19/43 (34,2 %)			16/38 (42,1)		
vyšší dle D-S	52/93 (55,9 %)			31/94 (33 %)			15/38 (39,5 %)			10/38 (26,3)		
vyšší A-L/L	6/93 (6,5 %)			13/94 (13,8 %)			10/38 (26,3 %)			12/38 (31,6 %)		
stratif. posun	p < 0,0001			p = 0,036			p = 0,372			NS		
Stadium dle ISS (%)												
1	23,7			14,9			15,8			10,5		
2		24,7			14,9			15,8			5,3	
3			19,4			25,5			31,6			34,2
celková shoda	58/93 (62,4 %)			52/94 (55,3 %)			24/38 (63,2 %)			19/38 (50,0 %)		
vyšší dle ISS	28/93 (30,1 %)			15/94 (16 %)			4/38 (10,5 %)			3/38 (7,9 %)		
vyšší A-L/L	7/93 (7,5 %)			27/94 (28,7 %)			10/38 (26,3 %)			16/38 (42,1 %)		
stratif. posun	p = 0,002			NS			p = 0,028			NS		
Riziková skupina dle A-L (%)												
1	–			22,6			–			10,5		
2		–			23,7			–			31,6	
3			–			18,3			–			39,5
celková shoda	–			60/93 (64,5 %)			–			31/38 (81,6 %)		
vyšší dle A-L	–			0/93 (0 %)			–			0/38 (0 %)		
vyšší dle L	–			33/93 (35,5 %)			–			7/38 (18,4 %)		
stratif. posun	–			p < 0,0001			–			p = 0,030		

D-S – stážovací systém dle Durie-Salmona, ISS – stážovací systém dle International Staging System, A-L – stratifikační model dle Avet-Loisiau, L – stratifikační model dle Ludwiga, NS – nesignifikantní vztah

stážováním dle D-S byla u IgG a IgA typu MM zaznamenána klasifikační shoda v 37,6 a 34,2 %, s ISS v 62,4 a 63,2 % a s modelem dle L v 64,5 a 81,6 %, zatímco v případě stratifikačního modelu dle L s D-S systémem v 53,2 a 42,1 %, s ISS v 55,3 a 50,0 %. Posun do vyššího stadia byl při srovnání stratifikačního modelu dle A-L se stážováním dle D-S v IgG a IgA souboru MM zaznamenán pouze v 6,5 a 26,3 %, s ISS v 7,5 a 26,3 % a s modelem dle L u žádného nemocného, zatímco v případě modelu dle

L vůči D-S v 13,8 a 31,6 % oproti ISS v 28,7 a 42,1 % a vůči A-L v 35,5 %. Z tabulárního přehledu (tab. 7) jednoznačně vyplývá, že posun do vyššího stadia byl zaznamenán u IgG a IgA typu MM v případě srovnání systémů D-S vs. A-L (55,9 a 26,3 %) a ISS (30,1 a 10,5 %), systému dle L vs. D-S (33 a 26,3 %) a ISS (16 a 7,9 %). Stratifikační posun byl statisticky vysoce významný v případě IgG typu MM při srovnání systému dle D-S i ISS oproti modelu dle A-L a méně významně D-S vůči modelu dle L, zato stra-

tifikační posun systémů dle ISS vs. L byl nesignifikantní. Stratifikační posun do vyššího stadia zjištěný v případě modelu dle L oproti modelu dle A-L lišících se navzájem odlišnými hodnotami cut-off HLC-r (< 0,022 nebo > 45 vs. < 0,01 nebo > 200) byl vysoce signifikantní v případě IgG (p < 0,0001), méně významný u IgA typu MM (p = 0,030) (tab. 7).

Diskuze

Index HLC-r vyšetřený pomocí metody Hevylite™ je ve srovnání s hodnotou Mlg

stanovenou s pomocí elektroforézy séra (SPE) neinvazivním, i když nepřímým ukazatelem výskytu myelomových (monoklonálních) vs. reziduálních normálních (polyklonálních) plazmocytů v KD [3,4]. Vzhledem k eliminaci zkreslení hodnot Mlg a albuminu v důsledku změn krevního objemu a hematokritu i variability katabolického poločasu Mlg závislého na saturaci neonatálních FcRn je Hevylite™ taktéž citlivější metodou v hodnocení rozsahu nádorové masy nežli SPE [3,4,16,19,20,22–26]. Izotypově specifická suprese Plg (u-HLC) nasvědčuje, že v případě IgG izotypu MM „niche“ mikroprostředí KD je selektivně postiženo v důsledku proliferace myelomových buněk secernujících především IgG typ paraproteinu [16]. Statisticky signifikantní, obecně platný vztah výše indexu *HLC-r k stádiím a s rozdílností v podstadiích A vs. B dle D-S a stadií 1–3 dle ISS u IgG, nikoliv u IgA typu MM nasvědčuje platnosti vztahu výše indexu *HLC-r k pokročilosti nemoci pouze u IgG izotypu MM. Signifikantní vztah *HLC-r u IgG, nikoliv u IgA typu MM k tíži anémie, hypoalbuminémie a k hladinám β_2 -M, byl zaznamenán již v naší předchozí studii [18]. U IgA typu MM se hodnoty indexu *HLC-r nechovaly v stádiích MM vyčleněných s pomocí D-S a ISS konzistentně zřejmě v důsledku biologické odlišnosti IgG a IgA izotypu MM, podložené odlišnou syntézou a katabolismem obou Ig a albuminu v organizmu [16,27]. Molekuly FcRn ochraňují IgG Ig a albumin před digescí v důsledku interference s recyklací a uvolňováním z povrchu buněk zpět do krevní cirkulace, což vede k prodloužení poločasu života IgG. V případě funkční insuficience FcRn receptorů a/nebo vysoké koncentrace IgG Ig může být poločas života IgG a albuminu zkrácen až na tři dny, zatímco v případě normální koncentrace IgG Ig v rámci úplné protekce FcRn poločas prodloužen až na cca 21 dnů a v případě velmi nízkých hladin IgG může dosáhnout poločas života v důsledku maximální FcRn protekce až několika týdnů [3,23–25]. Vzhledem k tomu, že polyklonální i monoklonální frakce IgG jsou těmito ději postiženy obdobně, nejsou hodnoty HLC-r podstatně ovlivněny a vyjadřují stupeň nádorové produkce přes-

něji nežli koncentrace M-proteinu vyšetřené SPE [16]. Vzhledem k tomu, že β_2 -M je jednou z komponent lehkého řetězce heterodimerické FcRn, je i jeho molekula ovlivněna v procesu recyklace [3,23–26]. Biologická variabilita IgG a IgA izotypu Ig byla potvrzena výsledky prognosticky zaměřené studie L prokazující signifikantně významněji spojení mezi supresí u-HLC a délkou OS u IgG nežli u IgA typu MM [19]. Biologickou odlišnost IgG a IgA izotypu HLC demonstruje rovněž prediktivní role zvýšené hodnoty indexu HLC-r k rozvoji maligní transformace MGUS, určená především supresí u-HLC opačného typu (např. supresí IgG- λ u IgG- κ typu MGUS), validní pro IgG, nikoliv pro IgA typ MGUS [28]. Absence predikčního potenciálu u IgA typu MGUS je zřejmě determinována absencí „niche“ efektu specifického pouze pro IgG typ MGUS [28]. Východiskem využití HLC-r jako jednoho z kritérií nově navržených stratifikačních modelů dle A-L a L je zřejmě jeho role markeru imunoparézy s prokázaným vztahem k PFS a OS [3,16,19,29,30]. S pomocí multivariátní Coxovy regresní analýzy bylo zjištěno, že hodnoty HLC-r a β_2 -M mají ve srovnání s albuminem, FLC-r a cytogenetickými nálezy typu del 13,t(4;14) a del 17p signifikantně významnější vztah k prognóze MM [14,16]. Vzhledem k tomu, že index HLC-r je prediktorem kratší délky PFS na albuminu a β_2 -M, byl použit jako jedno z kritérií u obou nových stratifikačních modelů [3,13,14,16,31].

Nově sestavený stratifikační model vypracovaný A-L [13,14], alternativní k ISS stážovacímu systému a vyznačující se záměnou albuminu za index HLC-r se ve studii Bradwella [16], a to zejména v kategorii high-risk, projevil prognosticky podstatně silnějším vztahem k PFS [16,32,33]. Dokladem obecné vhodnosti indexu HLC-r pro prognostickou stratifikaci MG je rovněž jeho uplatnění spolu s β_2 -M a LDH v třístupňové stratifikaci Waldenströmovy choroby [34,35]. Chybějící signifikance vztahu hodnot indexu FLC-r ke stádiím dle D-S a ISS a zejména k rizikovým skupinám MM vyhodnoceným dle A-L a L založených na hodnotě indexu HLC-r vyplývá z odlišného metabolismu a kinetiky FLC a HLC, a tím i indexů FLC-r a HLC-r, [15] a z di-

ferentních biologických charakteristik FLC- κ a FLC- λ vyznačujících se odlišným syntetickým i katabolickým poločasem, vedoucím k rozdílnosti jejich přirozených sérových hladin [3,4]. Přestože s narůstající „rizikovostí“ kategorií MM vyhodnocenou podle A-L a L byla v naší analýze IgG a IgA izotypu zřejmá tendence k vzestupu hodnot indexu FLC-r, nedosáhla statistické signifikance.

Dokladem obecně platného biologického zázemí A-L a L stratifikace k rizikovosti MM je většinou signifikantně vyjádřený vztah rizikových kategorií (low-, intermediate- a high-risk) k laboratorním PF vyznačujícím se úzkým vztahem k náloži nádorové masy, tj. Hb, albuminu a kreatininu u IgG a poněkud méně významně se totéž týká Hb, trombocytů a albuminu v méně početném souboru s IgA izotypem MM. Převážně nesignifikantní vztah Ca a LDH, případně i trombocytů u IgG izotypu je vysvětlitelný nejen jejich přirozeně nižším prognostickým potenciálem, ale i nízkým zastoupením abnormálních hodnot v analyzované sestavě (7,5, 16,6 a 16,6 %), relativizující dosažené výsledky. Vysoká signifikance mezi hladinou β_2 -M a rizikovými skupinami dle A-L a L v IgG a IgA souborech MM je logická a vyplývá z okolnosti, že jde o jedno z kritérií obou stratifikačních modelů. Naše zjištění, že oba stratifikační modely založené na indexu HLC-r významně rezonují s klíčovými PF MM (Hb, albumin a kreatinin), je do značné míry kompatibilní se závěry jediné obdobně zkoncipované studie popisující signifikantní vztah vysokých, medián převyšujících hladin IgG, nikoliv IgA i-HLC k tíži anémie (Hb < 100 g/l), k hodnotám FLC-r a albuminu převyšujícím vypočtený medián i > 50% infiltraci KD a v případě korelace s HLC-r i s hodnotou β_2 -M > 3,5 mg/l [7].

Z porovnání výsledků stratifikace souborů s odlišným izotypem Mlg, tj. IgG a IgA s pomocí standardních stážovacích systémů (D-S a ISS) a stratifikačních modelů založených na vyšetření HLC-r (A-L a L) vyplynula značná rozdílnost, patrná zejména v zastoupení stadií 1 a 3. Na rozdíl od vysoce proporciální stratifikace dle ISS s cca 30% zastoupením stadií 1–3 se vyznačoval stážovací systém dle D-S dobře známou nerovnoměr-

ností s malým zastoupením nemocných s nízkou (stadium 1) oproti nemocným s velkou nádorovou masou (stadium 3). Ve stratifikaci dle A-L převažovala u IgG i IgA izotypu riziková kategorie 2 (intermediate-risk), zatímco v modelu dle L dominovala kategorie 3 (high-risk) s nízkým zastoupením kategorie 1 (low-risk).

S pomocí McNemar-Bowkerova testu byla zjištěna u IgG i IgA typu MM nejvyšší shoda mezi stratifikačními modely dle D-S a L v kategorii 3 (high-risk). Nápadnější shoda v rozptřeni všech stadií (1–3), resp. rizikových kategorií (low-, intermediate- a high-risk) byla zjištěna při srovnání stažování dle ISS se stratifikací dle A-L, v menší míře i podle L především v souboru IgG. Při srovnání výsledků stratifikace modelů založených na hodnocení HLC-r bylo zřejmé vyšší zastoupení kategorie 3 (high-risk) v modelu dle L nežli podle A-L u IgG i IgA typu MM (42 vs. 18 % a 53 vs. 39 %). V obou izotypech MM, zejména ale u IgA typu, byla zjištěna nejužší celková shoda ze všech stratifikací mezi oběma novými modely, tj. podle A-L a L (IgG 64,5, IgA 81,6 %). Nutno připomenout, že kritéria rizikové skupiny 1 (low-risk) v stratifikačním modelu dle A-L i L se vyznačují hodnotou indexu HLC-r, blíží se hodnotám normálního rozmezí a zahrnují převážně nemocné s normální hladinou u-HLC, odpovídající dobrému zastoupení normálních/polyklonálních plazmocytů a nízké hladině monoklonálního i-HLC jako výrazu relativně nízkého zastoupení monoklonálních/myelomových buněk [36].

Závěr

Ze studie vyplývá, že oba nově sestavené stratifikační modely MM založené na stanovení poměru párů i-HLC/u-HLC (HLC-κ/HLC-λ) imunoglobulinu, tj. HLC-r, jsou snadno prakticky použitelné a podložené signifikantním vztahem ke stěžejním prognostickým ukazatelům MM. Určitým nedostatkem je doposud stále omezená dostupnost Hevylite™ metody v běžné klinické praxi a odlišnost výsledků zjištěná u IgG a IgA izotypu MM omezující jejich univerzální využití a vyvolávající potřebu separátní aplikace. K definitivnímu zhodnocení potenciálního přínosu a výběru jednoho z mo-

delů, tj. podle A-L, nebo L pro klinickou praxi, je nezbytné vyčkání výsledku připravované validační studie zaměřené na ověření pilotně popsaného signifikantního vztahu A-L i L stratifikace k PFS a OS. Příznivou vlastností obou stratifikačních modelů je jejich nepochybná pružnost, umožňující průběžnou aktualizaci „rizikovosti“ nemocných v průběhu nemoci jako východiska případné změny aktuální léčby.

Literatura

1. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A et al. International myeloma working group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *Lancet Oncol* 2014; 15(12): e538–e548. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70442-5.
2. Hajek R, Adam Z, Scudla V et al. Guidelines of Czech Myeloma Group 2012: diagnosis and treatment of multiple myeloma. *Transf Hematol* 2012; 18: 5–89.
3. Bradwell AR. Analysis of immunoglobulin heavy chain/light chain pairs (Hevylite™). In: Bradwell AR (ed.). Serum free light chain analysis (plus Hevylite). 6th ed. Birmingham: the Binding Site Ltd 2010: 301–320.
4. Bradwell AR, Harding SJ, Fourrier NJ et al. Assessment of monoclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios. *Clin Chem* 2009; 55(9): 1646–1655. doi: 10.1373/clinchem.2009.123828.
5. Keren DF. Heavy/light-chain analysis of monoclonal gammopathies. *Clin Chem* 2009; 55(9): 1606–1608.
6. Katzmán JA, Kyle RA, Benson J et al. Screening panels for detection of monoclonal gammopathies. *Clin Chem* 2009; 55(8): 1517–1522. doi: 10.1373/clinchem.2009.126664.
7. Koulieris E, Panayiotidis P, Harding SJ et al. Ratio of involved/uninvolved immunoglobulin quantification by Hevylite™ assay: clinical and prognostic impact in multiple myeloma. *Exp Hematol Oncol* 2012; 1: 9. Available from: <http://www.enhonline.org/content/1/1/9>.
8. The Binding Site Group Ltd. Practical consideration of Hevylite immunoassays. In: The Binding Site Group Ltd. Serum free light chain analysis plus Hevylite. 7th ed. Birmingham: the Binding Site Ltd 2015: 95–121.
9. Vavrova J. Assessment of free light chains and Hevylite™ in monoclonal gammopathies. In: Maisnar V, Tichý M (eds). Monoclonal immunoglobulins – occurrence, significance and possibilities of their detection. 1st ed. Praha: Nucleus Hradec Kralove 2012: 55–60.
10. International Myeloma Working Group. Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Working Group. *Brit J Haematol* 2003; 121(5): 749–757.
11. Bergsagel PL, Kuehl WM, Zhan F et al. Cyclin D dysregulation: an early and unifying pathogenetic event in multiple myeloma. *Blood* 2005; 106(1): 296–303.
12. Shaughnessy JD Jr, Zhan F, Burington BE et al. A validated gene expression model of high-risk multiple myeloma is defined by deregulated expression of genes mapping to chromosome 1. *Blood* 2007; 109(6): 2276–2284.
13. Avet-Loiseau H, Harousseau JL, Moreau P et al. Heavy/light chain specific immunoglobulin ratios at presentation are prognostic for progression free survival in the IFM 2005–01 myeloma trial. *Blood* 2009; 114: 722: abstr. 1818.

14. Avet-Loiseau H, Mirbahai L, Harousseau JL et al. Serum immunoglobulin heavy/light chain ratios are independent risk factors for predict progression free survival in multiple myeloma. *Haematologica* 2010; 95: 395.
15. Ludwig H, Milosavljevic D, Zojer N et al. Immunoglobulin heavy/light chain ratios improve paraprotein detection and monitoring, identify residual disease and correlate with survival in multiple myeloma patients. *Leukemia* 2013; 27(1): 213–219. doi: 10.1038/leu.2012.197.
16. Bradwell AR, Harding S, Fourrier N et al. Prognostic utility of intact immunoglobulin Igκ/Igλ ratios in multiple myeloma patients. *Leukemia* 2013; 27(1): 202–207. doi: 10.1038/leu.2012.159.
17. Ščudla V, Lochman P, Pika T et al. Analýza vztahu párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (Hevylite™) k výsledkům gelové elektroforézy a nefelometrickému vyšetření proteinů séra při diagnóze mnohočetného myelomu. *Čas Lék Čes*. In press 2015.
18. Scudla V, Lochman P, Pika T et al. Differences in relationship between immunoglobulin heavy/light chain pairs (Hevylite™) and selected laboratory parameters and stratification systems in different immunochemical types of multiple myeloma. *Biomedical Papers*. In press 2015.
19. Ludwig H, Milosavljevic D, Zojer N et al. Suppression of the non-involved HLC pair correlates with survival in newly diagnosed and relapsed/refractory patients with myeloma. *Congres of European Haematology Association, Milano* 2014: abstr. 980.
20. Katzmán JA, Rajkumar SV. A windows into immunoglobulin quantitation and plasma cell disease: antigen epitopes defined by the junction of immunoglobulin heavy and light chains. *Leukemia* 2013; 27(1): 1–2. doi: 10.1038/leu.2012.201.
21. Greipp PR, San Miguel J, Durie BG et al. International staging system for multiple myeloma. *J Clin Oncol* 2005; 23(15): 3412–3420.
22. Alexanian R. Blood volume in monoclonal gammopathy. *Blood* 1997; 49(2): 301–307.
23. Kim J, Hayton WL, Robinson JM et al. Kinetics of FcRn-mediated recycling of IgG and albumin in human: pathophysiology and therapeutic implications using a simplified mechanism-based model. *Clin Immunol* 2007; 122(2): 146–155.
24. Akilesh S, Christianson GJ, Roopenian DC et al. Neonatal FcR expression in bone marrow-derived cell functions to protect serum IgG from catabolism. *J Immunol* 2007; 179(7): 4580–4588.
25. Anderson CL, Chandhury C, Kim J et al. Perspective FcRn transports albumin: relevance to immunology and medicine. *Trends Immunol* 2006; 27(7): 343–348.
26. Chandhury C, Brooks C, Carter D et al. Albumin binding to FcRn: distinct from the FcRn-IgG interaction. *Biochemistry* 2006; 45(15): 4983–4990.
27. Pika T, Hermanova Z, Lochman P et al. System Hevylite™ and IgA monoclonal gammopathy – first experience. *Klin Biochem Metab* 2011; 19: 86–91.
28. Katzmán JA, Clark R, Kyle RA et al. Suppression of uninvolved immunoglobulins defined by heavy/light chain pair suppression is a risk factor for progression of MGUS. *Leukemia* 2013; 27(1): 208–212. doi: 10.1038/leu.2012.189.
29. Murillo-Florez I, Andrade-Campos M, Montes-Limon A et al. Predictive value of light and heavy chain analysis in multiple myeloma patients treated with bortezomib. *Haematologica* 2013; 98: 1519a.
30. Koulieris E, Maltezas D, Eytchya N et al. Impact of novel M-component based biomarkers on to progression free survival after treatment in intact immunoglobulin multiple myeloma. *Blood* 2012; 120: 121.

31. Ludwig H, Faint J, Zojer N et al. Serum heavy/light chain and free light chain measurements provide prognostic information, allow creation of a prognostic model and identify clonal changes (clonal tiding) through the course of multiple myeloma. *Blood* 2011; 118: 1244.
32. Avet-Loiseau H, Mirbahai L, Mathiot C et al. Nephelometric assays Ig kappa and Ig lambda used for diagnosing and monitoring multiple myeloma. *Haematologica* 2011; 96: 393a.
33. Kraj M. Immunoglobulin heavy chain/light chain pairs (HLC, Hevylite™) assays for diagnosing and monitoring monoclonal gammopathies. *Adv Clin Exp Med* 2014; 23(1): 127–133.
34. Koulieris MW, Kyrtsolis MC, Maltezas D et al. Quantification of serum IgM-kappa and IgM-lambda in patients with Waldenström's macroglobulinemia (WM) at diagnosis and during disease course. Clinical correlations. *Blood* 2010; 1116: 1238.
35. Leleu X, Koulieris E, Maltezas D et al. Novel M-component based biomarkers in Waldenström's macroglobulinemia. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2011; 11(1): 164–167. doi: 10.3816/CLML.2011.n.039.
36. Lakomy D, Lemaire-Ewing S, Denimal D et al. Evaluation of the new Hevylite™ IgA assay for the diagnosis and follow-up of monoclonal gammopathies. *Ann Biol Clin* 2013; 71(2): 157–163. doi: 10.1684/abc.2013.0805.