

Dohoda

České onkologické společnosti ČLS JEP s VZP ČR na postupu při posuzování úhradových podmínek u algoritmu léčby HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu.

Na základě jednání členů ČOS JEP ČLK a plátců zdravotní péče konaného dne 9. 1. 2015 z důvodu potřeby zajištění systému **poskytování a úhrady kvalitní dostupné péče** pro pacientky s diagnózou HER2 pozitivní metastazující karcinomu prsu, v souladu se současnými dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly na následujících podmínkách:

- 1) V případě léčby v rámci **1. linie léčby** HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu **není již nutné** žádat revizního lékaře VZP o úhradu kombinace trastuzumab + pertuzumab + paclitaxel jako náhradu za kombinaci trastuzumab + pertuzumab + docetaxel, a to v případě, že byla u pacientky již zaznamenána předchozí závažná toxicita po docetaxelu, nebo podání docetaxelu není možné.
- 2) V případě **1. linie léčby HER2 pozitivního/HR pozitivního** metastazujícího karcinomu prsu kombinací trastuzumab + pertuzumab + taxan je po ukončení chemoterapie indikována **udržující** kombinace léčby trastuzumab + pertuzumab + hormonální léčba (např. inhibitory aromatázy).
- 3) V případě, kdy u nemocné s potvrzeným HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu byla zahájena léčba 1. linie systémovou chemoterapií **bez anti HER2 terapie mimo pracoviště KOC**, bude po odeslání nemocné na pracoviště KOC, a to bez ohledu na podání jednoho nebo několika málo cyklů chemoterapie, zahájena standardní prvoliniová léčba tj. kombinace anti HER2 léčby + chemoterapie. Tím není dotčeno právo pojišťovny odmítnout úhradu předchozí non lege artis léčby.
- 4) Linie anti HER2 léčby u metastazujícího karcinomu prsu: anti HER2 léčba se podává u nemocné vždy do progresse onemocnění nebo do její toxicity. Ve většině případů se tato léčba kombinuje s chemoterapií. Pokud je nutné v průběhu léčby změnit cytostatikum za jiné cytostatikum z důvodu jeho toxicity (např. změna docetaxelu za paclitaxel apod.), jedná se stále o tutéž linii léčby.
- 5) Trastuzumab emtansin je indikován i u pacientek, u kterých došlo k progresi onemocnění při léčbě lapatinibem a to za předpokladu, že tato léčba byla zahájena v době před

schválením úhrady trastuzumab emtansinu (tzn. do 1. 3. 2015). Ošetřující lékař předem požádá revizního lékaře o souhlas s úhradou.

Na základě této dohody, uzavřené mezi ČOS JEP ČLK a VZP ČR **nebude použít** výše jmenovaných léčebných postupů u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu předmětem **zamítnutí úhrady při revizních kontrolách.**



.....
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP



.....
MUDr. JUDr. Petr Honěk,
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

Dne 10.3.2015